

Procédure

La conservation des médicaments



Formes solides et semi-solides

Comprimés, capsules, poudres, granulés, suppositoires, ovules : date d'expiration indiquée sur l'emballage si conservation dans l'emballage d'origine (2 à 5 ans).

Collyres, gels et pommades ophtalmiques

En règle générale : conservation 1 mois après ouverture.

Exceptions :

- Cébémixine pommade ophtalmique : 15 jours.
- Fucithalmic 1 % : 15 jours.
- Gentamicine 0,3 % pommade ophtalmique : 15 jours.
- Conservation 15 jours après ouverture : Acular, Almide 0,1 %, Catacol, Catarstat, Cébémixine, Cébénicol, Cébésine 0,4 %, Chibro-cadron, Chibroxine 0,3 %, Ciloxan 0,3 %, Collyre bleu, Correctol, Euronac, Exocine 0,3 %, Frakidex, Gentamicine 0,3 %, Indobiotic, Indocollyre 0,1 %, Maxidrol, Mydriaticum, Naaxia, Ocuferen 0,03 %, Posicycline, Soptal, Tobrex.
- Conservation 8 jours après ouverture : Cromabak 2 %, Larmabak.
- Conservation 10 jours après ouverture : Bacicoline.

- Conservation 12 semaines après ouverture : Allergo-comod, Hylo-comod.

Pommades, crèmes, gels et lotions

En règle générale :

En tube ou flacon : 1 an après ouverture.
En pot : 3 mois après ouverture.

Exceptions :

- Auréomycine Evans : 8 jours.
- Bétadine alcoolique, bain de bouche, dermatique, gynécologique, pommade, scrub : 1 mois.
- Cetavlon : 1 mois.
- Crème Emla (prilocaine, lidocaïne) : 28 jours.
- Dakin : 1 mois.
- Flammazine : 8 jours.
- Fucidine 2 % crème : 10 jours.
- Fucidine 2 % pommade : 10 jours.

Gouttes auriculaires

Conservation 1 mois à température ambiante. Usage personnel.

Gouttes, spray et pommades nasales

Conservation 1 mois à température ambiante.
Usage personnel.

Préparations liquides orales

En règle générale : 6 mois après ouverture.

Conservation 7 jours après ouverture :

- Amoxicilline/Clamoxyl.
- Augmentin suspension/gouttes (réfrigérateur).
- Clamoxyl sirop (température ambiante).
- Érythrocline suspension (réfrigérateur).

Conservation 10 jours après ouverture :

- Tamiflu.

Conservation 1 mois après ouverture :

- Atarax.
- Codenfan.
- Débridat suspension buvable.
- Dépakine.
- Déroxat.
- Dogmatil.
- Doliprane.
- Gaviscon suspension buvable nourrissons.
- Haldol 20 mg/ml.
- Imodium suspension buvable.
- Lysanxia.
- Prozac.
- Rhinathiol.
- Tussidane avec et sans sucre.

Conservation 5 semaines après ouverture :

- Advil.

Conservation 2 mois après ouverture :

- Célestène.
- Néoral.
- Tégrétol.
- Ziagen solution buvable.

Conservation 3 mois après ouverture :

- Gaviscon suspension buvable adulte.
- Haldol 2 mg/ml.
- Laroxyl.
- Motilium suspension.
- Rivotril.

Conservation 7 mois après ouverture :

- Théralène.

Procédure n° :

Cadre pour le tampon de la pharmacie

Signatures de l'équipe