

LIBELLÉ DE LA PRÉSENTATION	PRINCIPES ACTIFS DU PRODUIT	EXCIPIENTS NOTABLES	LABORATOIRE EXPLOITANT	MODE D'EMPLOI	PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
HEGOR ANTIPOUX shampooing	Phénothrine forme D	Acide acétique, formaldéhyde	Coryne de Bruynes	2 shampooings successifs avec pose de 3 à 5 min. A renouveler le lendemain	Ne pas mettre en contact avec l'œil ou les muqueuses.
ITAX shampooing antipoux	Phénothrine forme D	Méthylparabène	Ducray	2 shampooings successifs avec pose de 5 min. A renouveler le lendemain	Ne pas mettre en contact avec l'œil ou les muqueuses.
ITEM ANTI POUX lotion	Phénothrine forme D	Méthylparabène, propylparabène	Dermophil Indien	Bien humidifier le cuir chevelu et la chevelure, laisser en contact 10 min puis rincer	Ne pas mettre en contact avec l'œil ou les muqueuses.
ITEM ANTI POUX shampooing	Phénothrine forme D	Méthylparabène, propylparabène	Dermophil Indien	1 shampooing avec pose de 5 à 10 min. A renouveler le lendemain	Ne pas mettre en contact avec l'œil ou les muqueuses.
PARA PLUS sol p pulv cut en flacon pressurisé	Permethrine : malathion ; pipéronyl butoxyde		Omega Pharma	Pulvériser sur cheveux secs, laisser agir 40 min puis laver avec un shampooing doux	En raison d'un risque d'inflammation, ne pas fumer, appliquer dans un endroit aéré et loin de toute flamme. Ne pas utiliser de sèche-cheveux. Protéger les yeux, le nez et la bouche avec une serviette. Contre-indiqué chez les sujets asthmatiques et en cas d'antécédent de bronchite dyspnéisante avec sibilants chez l'enfant ou le nourrisson. Ne pas mettre en contact avec l'œil ou les muqueuses.
PARASIDOSE shampooing	Phénothrine	Camphre, acide acétique	Gilbert	2 shampooings successifs avec pose de 5 min pour le second. A renouveler le lendemain.	Cl chez l'enfant de moins de 30 mois. avec pose de 3 min Ne pas utiliser chez la femme allaitante. Risque de convulsions avec dérivé terpénique. Ne pas mettre en contact avec l'œil ou les muqueuses.
PARA SPECIAL POUX shampooing	Dépalléthrine : pipéronyl butoxyde	Méthylparabène, propylparabène	Omega Pharma	2 shampooings successifs avec pose de 5 min pour le second. A renouveler le lendemain.	Ne pas mettre en contact avec l'œil ou les muqueuses.
PARA SPECIAL POUX sol p appl loc en flacon pressurisé	Dépalléthrine : pipéronyl butoxyde		Omega Pharma	Pulvériser sur cuir chevelu et cheveux secs, laisser agir 30 min puis laver avec un shampooing doux	En raison d'un risque d'inflammation, ne pas fumer, appliquer dans un endroit aéré et loin de toute flamme. Ne pas utiliser de sèche-cheveux. Protéger les yeux, le nez et la bouche avec une serviette. Contre-indiqué chez les sujets asthmatiques et en cas d'antécédent de bronchite dyspnéisante avec sibilants chez l'enfant ou le nourrisson. Ne pas mettre en contact avec l'œil ou les muqueuses.
PRIODERM 0,5 % lotion	Malathion	Terpinéol	Meda Pharma	Pulvériser sur cuir chevelu et cheveux secs, laisser agir 8 heures puis laver avec un shampooing doux. Renouveler 7 jours après si besoin.	Protéger les yeux et le visage avec une serviette, ne pas fumer ou utiliser près d'une flamme, laisser sécher à l'air libre. Risque de convulsions avec dérivé terpénique. Ne pas mettre en contact avec l'œil ou les muqueuses.
PRIODERM 0,5 % sol p appl cutanée en flacon pressurisé	Malathion	Terpinéol	Meda Pharma	Pulvériser sur cuir chevelu et cheveux secs, laisser agir 8 heures puis laver avec un shampooing doux. Renouveler 7 jours après si besoin.	Protéger les yeux et le visage avec une serviette, ne pas fumer ou utiliser près d'une flamme, laisser sécher à l'air libre. Risque de convulsions avec dérivé terpénique. Contre-indiqué chez les sujets asthmatiques et en cas d'antécédent de bronchite dyspnéisante avec sibilants chez l'enfant ou le nourrisson. Ne pas mettre en contact avec l'œil ou les muqueuses.
PYREFLOR shampooing	Permethrine; pipéronyl butoxyde		Marque Verte Semes	2 shampooings successifs avec pose de 5 min pour le second. A renouveler 2 jours après.	Ne pas mettre en contact avec l'œil ou les muqueuses.