



Sogroya

HORMONE DE CROISSANCE À LONGUE DURÉE

Par Sylvie Hernola

Retard de croissance

Début octobre, le laboratoire Novo Nordisk a annoncé la mise à disposition de Sogroya (somapacitan), son hormone de croissance à longue durée d'action. Cette solution injectable en stylo prérempli est indiquée en première intention, pour le traitement substitutif de l'hormone de croissance endogène chez les enfants de 3 ans et plus, et les adolescents présentant un retard de croissance dû à un déficit en hormone de croissance (GHD - Growth hormone deficiency), et chez les adultes présentant un GHD.

Une fois par semaine

Le somapacitan est un analogue de la somatropine, hormone de croissance humaine recombinante (rhGH). «Sogroya agit à la fois directement via le récepteur GH (Growth Hormone) et à la fois indirectement via l'IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor-1) produit dans les tissus, le cartilage de croissance et essentiellement dans le foie», souligne Novo Nordisk. Grâce à sa structure qui se fixe à l'albumine et ralentit son élimination dans l'organisme, le somapacitan est caractérisé par une durée d'action allongée, ce qui permet son administration une fois par semaine.

SMR important

Sogroya a reçu un avis favorable au remboursement en janvier 2024 par la Haute Autorité de santé (HAS) qui lui a accordé un SMR important en pédiatrie et

modéré chez l'adulte. Le somapacitan offre ainsi une nouvelle option thérapeutique «par rapport aux injections quotidiennes de somatropine dans les deux indications, et hebdomadaires de somatogon pour le GHD chez les adolescents et les enfants âgés de 3 ans et plus», indique la HAS.

Médicament d'exception

Sogroya est un médicament d'exception, soumis à prescription initiale hospitalière annuelle. La primo-prescription, comme le renouvellement, est réservée aux spécialistes en pédiatrie et en endocrinologie-diabétologie-nutrition. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont : céphalées, douleurs dans les extrémités, hypothyroïdie, réactions au site d'injection, œdème périphérique, arthralgie, hyperglycémie, fatigue et insuffisance cortico-surrénalienne.

Sans aiguille

Ce médicament doit être injecté une fois par semaine, en sous-cutané, et à n'importe quel moment de la journée. Le site d'injection (abdomen, cuisse, fesse ou haut du bras) doit être changé chaque semaine. Attention, les aiguilles d'injection ne sont pas fournies ! Elles doivent être prescrites et délivrées à part, avec une aiguille d'une longueur maximale de 8 mm et d'un diamètre minimal de 32 G. Le stylo doit être conservé sans aiguille fixée.

Guide patient

Chaque stylo permet d'injecter plusieurs doses. La dose à injecter doit être sélectionnée en tournant le sélecteur de dose du stylo, dans le sens des aiguilles d'une montre. Un cran correspond à 0,05 mg ou 0,10 mg dans le compteur de doses. Un carnet patient et une vidéo de démonstration sont disponibles en flashant ce QR code. ■



EN BREF

- **Médicament d'exception sur liste 1**
- **Remboursement SS : 100 %**
- **À conserver au frais**
- **SOGROYA 10 mg/1,5 mL**
solution injectable en stylo prérempli (capuchon jaune)
Prix : 402,97 euros
CIP 3400930247297
- **SOGROYA 15 mg/1,5 mL**
solution injectable en stylo prérempli (capuchon rouge)
Prix : 599,47 euros
CIP 3400930278017